



TOSSE DEI CANILI

La **tosse dei canili** è una malattia o una sindrome respiratoria molto contagiosa. Si trasmette per contatto ravvicinato con un cane infetto. Sono coinvolti il virus della *Parainfluenza* e il batterio *Bordetella bronchiseptica*, che vengono trasmessi nell'aria dai cani infetti in seguito a starnuti e tosse.

L'infezione si diffonde rapidamente e colpisce un'elevatissima percentuale di cani. Gli agenti infettivi danneggiano e irritano il rivestimento della trachea e delle vie respiratorie superiori, causando la tosse.

I sintomi comprendono una tosse profonda e molto forte e questo può provocare conati di vomito, starnuti, sbuffi, sensazione di strozzamento o vomito. Spesso la tosse inizia dopo un momento di agitazione o dopo l'attività fisica. Spesso viene osservato scolo nasale e oculare e compare febbre. Raramente la malattia può progredire fino alla polmonite.

Durante le epidemie, solitamente vengono infettati molti cani (fino all'80% nei canili), ma la maggioranza guarisce completamente. I sintomi iniziano 3-5 giorni dopo l'infezione e possono continuare anche per più di 3 settimane.

Prevenzione

La prevenzione viene attuata mediante la vaccinazione contro la *Bordetella bronchiseptica* e il virus della *parainfluenza* attraverso un vaccino intranasale. Le pensioni spesso non accettano cani che non sono stati vaccinati di recente. La vaccinazione va effettuata almeno 2 settimane prima di entrare nella pensione.